

MAHALAUKUN TÄHYSTYS (GASTROSKOPIA), POTILASOHJE

Tietoa tutkimuksesta

Ennen tutkimusta nautitaan 10 ml Antifoam-liuos neutraloimaan vatsahappoja, jolloin näkyvyys maahan paranee. Sen jälkeen lääkäri puuduttaa nielun Xylocain-suihkeella tähystimen nielemisen helpottamiseksi. Hammasproteesit otetaan suusta tutkimuksen ajaksi.

Tutkimus tapahtuu vasemmalla kyljellä maaten. Mahalaukkua tutkitaan taipuisalla tähystinlaitteella. Tähystinlaite viedään mahalaukkuun suun kautta ja sieltä edelleen ohutsuolen alkuun. Tutkimus kestää n. 10 min.

Tutkimuksen yhteydessä otetaan näytteitä mahalaukun limakalvolta. Näytteiden ottaminen ei aiheuta kipua.

Tutkimukseen valmistautuminen

Tutkimus aamulla klo 6.40 - 14.00

Teidän tulee olla syömättä, juomatta ja tupakoimatta edellisestä illasta klo 24.00 alkaen. Lääkkeet voitte ottaa tutkimuksen jälkeen.

Tutkimus iltapäivällä klo 14.00 jälkeen.

Tutkimuspäivän aamuna ennen klo 9.00 voitte ottaa nesteitä; vettä, mehua, lihalientä, mutta ei maitotuotteita.

Lääkkeistä

Reuma- ja särkylääkkeet ovat kiellettyjä tutkimuspäivänä. Sokeritauti- tai verenhennuslääkkeitä käyttävien on syytä kysyä tarkemmat ohjeet lähettävältä lääkäriltä.

Yleisohjeena on, että verenhennuslääkkeistä *Marevan* tulisi olla tauolla 3 päivää ennen tutkimusta, ja tutkimukseen tullessanne teillä olisi tiedossa tutkimuspäivän aamuna otetun INR-verikokeen vastaus. *Plavix* tai *Primaspan (Asperin, Disperin)* tulisi olla tauolla viikon ajan ennen tutkimusta. Verenhennuslääkkeen tauottaminen edellyttää, että sairautenne sallii sen. Asia on tärkeä varmistaa lähettävältä lääkäriltä.

Jos teillä on synnynnäinen sydänvika, keinoläppä tai läppävuoto, joka vaatii antibioottihoitoa (profylaksia) olkaa yhteydessä sairaanhoitajaan viimeistään tutkimusta edeltävänä päivänä.

Muut lääkkeenne voitte tutkimuspäivänä ottaa tavalliseen tapaan.

Tutkimuksen jälkeen

Tutkimuksen jälkeen voitte syödä kun puudutus on hävinnyt nielusta (n.20 min). Sokeritaudin lääkkeet voitte ottaa aterioinnin yhteydessä. Välttäkää kuumaa juomaa ja ruokaa tutkimuspäivänä. Lääkärilausunnon saatte heti tutkimuksen jälkeen mukaanne. Vastaus tähystyksessä otetuista näytepaloista lähetetään n. 3 viikon kuluessa lähettävälle lääkärille. Tutkimus ei edellytä muun kuin yleisen kulkuneuvon käyttöä.

Lisätietoja: ODL Lääkärikeskus, sairaanhoitaja puh. 010 345 3150